

# 【令和3年度 定期予防接種のお知らせ】

◆個別予防接種(会場:市内指定医療機関)

令和3年4月現在

予防接種名	対象者	接種回数			接種間隔	予診票等配布について	
ヒブ感染症	生後2か月～5歳未満 ※標準的な接種開始年齢は 生後2か月～7か月未満	開始月齢	初回	追加	初回:27日(医師が認める場合は20日)以上、標準的には56日までの間隔を空ける 追加:初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔を空ける	新生児訪問時に配布	
		2～7か月未満	3回	1回			
		7か月～1歳未満	2回	1回	※接種上の注意 【2～7か月未満で開始の場合】初回2回目・3回目の接種は1歳未満で行い、超えた場合は行わない。追加接種は初回接種に係る最後の接種終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回行う。 【7か月～1歳未満で開始の場合】初回2回目の接種は1歳未満で行い、超えた場合は行わない。追加接種は初回接種に係る最後の接種終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回行う。		
		1歳～5歳未満	1回				
小児の肺炎球菌感染症	生後2か月～5歳未満 ※標準的な接種開始年齢は 生後2か月～7か月未満	開始月齢	初回	追加	初回:27日以上の間隔を空けて、標準的には1歳までに接種する 追加:1歳以降に初回接種終了後60日以上の間隔を空けて接種。 標準的には1歳から1歳3か月で接種する	新生児訪問時に配布	
		2～7か月未満	3回	1回			
		7か月～1歳未満	2回	1回	※接種上の注意 【2か月～7か月未満で開始の場合】初回2回目の接種が1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わない。追加接種は実施可能。初回2・3回目の接種は2歳未満で行い、超えた場合は行わない。追加接種は実施可能。 【7か月～1歳未満で開始の場合】初回2回目の接種は2歳未満で行い、超えた場合は行わない。追加接種は実施可能。		
		1歳～2歳未満	2回				60日以上の間隔を空ける
		2歳～5歳未満	1回				
B型肝炎	1歳未満 ※標準的な接種期間は 生後2か月から生後9か月未満	初回	2回		27日以上の間隔を空ける	新生児訪問時に配布	
		追加	1回		1回目の接種から139日以上の間隔を空ける (20週後の同じ曜日から接種可能)		
*接種上の注意:母子感染(垂直感染)予防は、出生直後からの健康保険による予防接種となるため対象外。							
ロタウイルス感染症	生後6週に至った日の翌日にある者 ※標準的な接種開始時期は 生後2か月から14週6日 ロタリックス(1価) :24週0日までに接種 ロタテック(5価):32週0日までに接種	ロタリックス(1価) 2回			27日以上の間隔を空ける	新生児訪問時に配布	
		ロタテック(5価) 3回			27日以上の間隔を空ける		
*接種上の注意:ワクチンは2種類あります。必ず同じワクチンを接種してください。初回接種を出生14週6日までに完了することが望ましい。							
ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ(DPT-IPV)	生後3か月～7歳6か月未満 ※標準的な接種開始年齢は 生後3か月から1歳未満	1期初回	3回		20日以上、標準的には56日までの間隔を空ける	新生児訪問時に配布	
		1期追加	1回		1期初回終了後1年～1年半までの間隔を空ける		
*すでにDPTワクチンや不活化ポリオワクチンを1回以上接種したことがあっても、残りの回数を4種混合で接種することが可能です。免疫に必要な回数の接種がお済でない方は、保健センターもしくは主治医にご相談ください。							
※注 ジフテリア百日せき破傷風(DPT)	生後3か月～7歳6か月未満 ※標準的な接種開始年齢は 生後3か月から1歳未満	1期初回	3回		20日以上、標準的には56日までの間隔を空ける	保健センターや医療機関で配布	
		1期追加	1回		1期初回終了後1年～1年半までの間隔を空ける		
※注意 生ポリオワクチンおよび不活化ポリオワクチン、DPTワクチンを接種をした方は接種可能です。詳しくは保健センターまたは主治医にご相談ください。							
※注 不活化ポリオ(IPV)	生後3か月～7歳6か月未満 ※標準的な接種開始年齢は 生後3か月から1歳未満	初回	3回		20日以上、標準的には56日までの間隔を空ける	保健センターや医療機関で配布	
		追加	1回		初回終了後1年～1年半までの間隔を空ける		
※注意 DPTワクチン接種回数が不活化ポリオワクチン接種回数より多い場合のみ接種となります。詳しくは保健センターまたは主治医にご相談ください。							
*合計4回の接種になるように残りの回数をお受けください。経口生ポリオワクチンを2回接種されている方は接種する必要はありません。							