

## ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（DPT-IPV）予防接種

◆接種年齢：生後2か月から7歳6か月未満

◆接種方法：皮下接種（合計4回接種）

前回接種日を0日として21日目より接種可能です

1期初回：20日以上、標準的には56日までの間隔を空けて3回接種

1期追加：1期初回接種終了後1年～1年半までの間隔を空けて1回接種

◆接種場所：市内指定医療機関

◆持ち物：母子健康手帳、予診票

\*母子健康手帳を忘れた場合は接種できません。忘れずにお持ちください。\*

◆費用：無料

☆ジフテリア・百日せき・破傷風（DPT）ワクチンまたはポリオワクチン（生・単独不活化）のいずれかの接種を1回以上受けている方はジフテリア・百日せき・破傷風（DPT）ワクチンまたはポリオワクチン（生・単独不活化）の不足回数分を4種混合ワクチンで接種することが可能です。

☆1期の接種回数が不十分な場合2期（11歳～13歳未満）の接種時期に、自費で不足分の接種が必要となる場合があります。4回確実に接種しましょう。

\*\*\*\*\*

☆この予診票を使用できる方は、接種日時点で野田市に住民登録のある方です。転出された方は転出先の市町村窓口にご相談ください。

☆医療機関によって、予約が必要な場合や、予防接種を実施する時間帯や日程をあらかじめ決めていることがあります。事前に連絡してから受診しましょう。

☆予診票は医師にとって大事な情報です。責任をもって記入してください。記入漏れや間違いは予防接種の間違いにつながります。ボールペン等、消えない筆記用具で記入してください。

☆予防接種は体調のよいときに、お子様の体調がよくわかる保護者の方がお連れください。予防接種を受ける予定であっても、お子様の体調がよくないと思ったら接種は控えましょう。

☆接種後は、母子健康手帳の予防接種記入欄を再度、ご確認ください。

### 【ジフテリアについて】

ジフテリア菌による細菌性呼吸器感染症です。発熱・咽頭痛・頭痛・倦怠感・えん下痛などで始まり、鼻づまり・鼻血・かすれ声・呼吸困難・呼吸筋の麻痺などが続きます。適切な治療や予防接種で重症になることはまれとなりましたが、死に至ることもある病気として注意が必要です。

### 【百日せきについて】

コンコンと激しくせき込んだ後、ヒューと笛を吹くような音をたてる特有のせきがおよそ百日にわたって続く、百日せき菌による細菌性呼吸器感染症です。かぜ症状から始まり特有なせきが発作的に現れます。約1か月を過ぎるとせきの回数は少なくなります。回復には3か月ぐらいかかることもあります。合併症として、肺炎・鼻血・結膜出血があります。また激しいせきの後に脳出血を起こし死亡することがまれにあります。

裏面に続く

### 【破傷風について】

けがをしたときに土の中にいる破傷風菌が傷口に入って起こります。小さな傷からも感染することがあり、菌の毒素により神経の麻痺や筋肉のけいれんを起こし、死亡する確率の高い危険な病気です。自然感染による免疫は期待できない為、予防のためにもワクチンを接種して免疫をつけておくことが必要です。

### 【ポリオについて】

ポリオ（急性灰白髄炎）はポリオウイルスによっておこる病気で、1～2日のかぜ症状のあと、突然手足の麻痺が現れる感染症で、その麻痺は一生残ってしまうことが少なくありません。現在では予防接種の効果で国内の自然感染は報告されていませんが、海外ではまだポリオが流行している地域があります。そのため、国内に持ち込まれた場合、流行する可能性があります。ポリオを予防する唯一の方法は予防接種を受けることです。平成24年9月に病原性をなくした不活化ポリオワクチンの予防接種に切り替えられました。

### ★副反応について★

接種部位の発赤・腫れ・痛み等局所反応が最も多く、通常3～4日で消失します。ただし、腫れがひどい場合は接種部位を清潔にし、冷やして様子を見てください。硬結は縮小しながらも数か月残ることもあります。時に発熱（37.5～38.5度くらい）もあります。

なお、極めてまれに重大な副反応としてショック・アナフィラキシー様症状があります。

### ★こんなときは受けられません★

- ① 発熱しているとき（接種会場で体温が37.5度以上ある場合）※平熱が高い人は主治医に相談を
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
- ③ このワクチンの成分により、アレルギーを呈する恐れが明らかな場合
- ④ 以下の病気にかかった場合

麻疹（はしか）	治癒後4週間程度あける
風しん（三日はしか）・水痘（水ぼうそう）・おたふくかぜ等	治癒後2～4週間程度あける
突発性発疹・手足口病・溶連菌感染症・伝染性紅斑（りんご病）等	治癒後1～2週間程度あける

いずれの場合も医師の診察で予防接種の適否が判断されます

- ⑤ その他、医師が予防接種を受けることが不相当と認めた場合

### ★こんなときは受ける際に注意が必要です★

- ① 心臓病・腎臓病・肝臓病、血液の病気や発育障がいなどで治療を受けている場合
- ② これまで予防接種で、接種後2日以内に発熱及び発疹、じんましんなどのアレルギーと思われる異常がみられた場合
- ③ 過去にけいれんを起こしたことがある場合は、事前に主治医に相談してから受けましょう
- ④ 過去に免疫不全の診断がなされている場合及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる場合

### ★予防接種による健康被害救済制度について★

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなど、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

<問合せ先> 保健センター ☎04-7125-1190  
関宿保健センター ☎04-7198-5011

